

NCT05826119

05.09.2023

Laparoskopik histerektomi ve bilateral ooferektomi cerrahisinde magnezyum sülfat infüzyonunun perioperatif opioid tüketimi ve postoperatif analjezi üzerine etkisi

konulu çalışma Veri Toplama Formu

DEMOGRAFİK VERİLER;

Ad Soyad	
Yaş	
Kilo/Boy/VKİ	
Cerrahi Süre	
Anestezi Süresi	
ASA	

İNTRAOPERATİF TAKİP;

	Giriş	İndük. sonrası 1.dk	5.dk	10.dk	15.dk	20.dk	25.dk	30.dk	40.dk	50.dk	60.dk	75.dk
KH												
OAB												
SpO2												
	90.dk	115.dk	120.d k	150.dk	180.d k							
KH												
OAB												
SpO2												

CERRAHİ BİTİMİNDE;

Efedrin gerektiren hipotansif epizod sayısı	
Atropin gerektiren bradikardi epizod sayısı	
Toplam tüketilen remifentanil miktarı	
Derlenmede M.ALDRETE SKOR>8 gelme süresi	

POSTOPERATİF TAKİP;

	30.dk	2.s	4.s	6.s	12.s	24.s
Ağrı NRS						
İstirahatte:						

	Aktif(öksürken,yürürken):						
Sedasyon							
Bulantı-Kusma							

POSTOPERATİF 24. SAATİN SONUNDA;

İlk Tramadol istek zamanı (postop.kaçıncı saatte tramadol uygulanmış)	
Tramadol uygulama sayısı	
Toplam tüketilen fentanil miktarı	

Ağrı ‘Numerical Rating Scala ‘ (NRS)



Ramsay Sedasyon Skalası

1:	Uyanık,huzursuz ve/veya ağlıyor
2:	Uyanık, sakin, çevresini izliyor
3:	Uykulu fakat sözlü uyaranlara cevap verir
4:	Uykulu fakat glabellar taktil uyaranlara hemen cevap verir
5:	Uykulu fakat glabellar taktil uyaranlara yavaş yanıt verir
6:	Uyarılara yanıt vermez

Bulantı-kusma ‘Verbal Descriptive Scale’

0:	Bulantı yok
1:	Hafif bulantı
2:	Orta bulantı
3:	Bir kez kusma
4:	Çoklu kusma